

第2類医薬品

かぜに/肩こりに

漢方製剤 **葛根湯エキス[顆粒]A**葛根湯は漢方の原典である「傷寒論」^{ショウカンロン}「金匱要略」^{キンキョウリョク}に記載の代表的な薬です。

~~~~~ このような方に ~~~~~

- 熱があって、背筋がぞくぞくする寒けや、頭痛のかぜの症状に。
- 肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みに。
- 眠くなる成分は入っていません。

## ⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください**

1歳未満の乳児

**相談すること****1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

**2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください**

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状           |
|-------|---------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消 化 器 | 悪心、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 肝機能障害     | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。                      |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

(2) 1ヵ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合

**3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください**

**【効能・効果】**

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

**【用法・用量】**

食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

食間とは…食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|-----------|-------|--------|
| 大人(15歳以上) | 1包    | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包  |        |
| 7歳未満4歳以上  | 1/2包  |        |
| 4歳未満2歳以上  | 1/3包  |        |
| 2歳未満1歳以上  | 1/4包  |        |

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

**【成分・分量】**

| 成分・分量 本剤3包(1包1.5g)中           |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 日局カクコン……………4.0g               | 日局シャクヤク……………2.0g  |
| 日局マオウ……………3.0g                | 日局カンソウ……………2.0g   |
| 日局タイソウ……………3.0g               | 日局ショウキョウ……………1.0g |
| 日局ケイヒ……………2.0g                |                   |
| より抽出した葛根湯エキス粉末1700mgを含有しています。 |                   |

添加物として乳糖水和物、D-マンニトール、ヒドロキシブ  
 コピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含みます。

**〈成分に関連する注意〉**

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがありますが  
 効能・効果にはかわりありません。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
 (誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

**御所薬舗株式会社 お客様相談室**

住 所：〒639-2200 奈良県御所市1207番地

電 話：0745(62)3388

受付時間：午前9:00から午後5:00まで(土・日・祝日を除く)

発 売 元：**PI**株式会社プロダクト・イノベーション  
 富山県富山市大手町3番7号

製造販売元：御所薬舗株式会社  
 奈良県御所市1207番地