

内服液葛根湯 S

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

< 効能・効果 >

かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

< 用法・用量 >

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用する。

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児には服用させないこと。

< 成分・分量 >

1日量90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス	8.3g
カッコン	8g
マオウ	4g
タイソウ	4g
ケイヒ	3g
シヤクヤク	3g
カンゾウ	2g
ショウキョウ	1g
より得た軟エキス	

添加物としてブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有。

< 保管及び取扱い上の注意 >

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿が生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

発売元

株式会社プロダクト・イノベーション

富山県富山市大手町3番7号

製造元

萬金薬品工業株式会社

奈良県高市郡明日香村野口317

お客様相談室 TEL:0744-54-2012
AM8:30~PM5:00 土、日、祝日を除く