

# レオード胃腸内服液

押してあける

第3類医薬品

## △ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。  
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、本剤を持って医師又は薬剤師にご相談ください。  
2週間位服用しても症状がよくなるない場合

### 【効能・効果】

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

### 【用法・用量】

大人（15才以上）1回1本（30mL）を1日2回食前又は食間に服用してください。服用間隔は4時間以上あけてください。なお15才未満の方は服用しないでください。

※本剤は生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に影響はありません。よく振ってから服用してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）

【成分・分量】 1日量2本（60mL）中

カルニチン塩化物	200mg
精製カンゾウエキス末	114mg
(原生薬950mg)	
ゲンチアナ流エキス	300μL
(原生薬300mg)	
ケイヒ流エキス	300μL
(原生薬300mg)	
ニンジンエキス	120mg
(原生薬1320mg)	
チンビエキス	200mg
(原生薬1000mg)	
チョウジチンキ	60μL
(原生薬18mg)	

添加物としてℓ-メントール、クエン酸Na、白糖、ブドウ糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、カラメルを含有。

発売元

株式会社 プロダクト・イノベーション  
富山県富山市浜黒崎239番地

製造販売元

萬金薬品工業株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口317

お客様相談室 TEL:0744-54-2012  
AM8:30~PM5:00 土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931