

【販売名】オリーール浣腸40

第2類医薬品

【成分】(本品100g中)

日局 濃グリセリン 43%

添加物として塩化ベンザルコニウムを含有します。

【効能・効果】

便秘

【用法・用量】

12才以上1回1個(40g)を直腸内に注入します。それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。

【使用方法】

(1) 容器先端のキャップを取りはずし、肛門部になるべく深く挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)

(2) 容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。

(3) 薬液注入後、十分便意が強まってから排便してください。

●無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。

●冬季は容器を温湯(40℃)に入れ体温近くまで温めると快適に使用出来ます。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

連用しないこと(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになる。)

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腰痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

40

Piオリーール浣腸


日局 濃グリセリン
43%

40g

第2類医薬品

40g x 10個入

先端が柔らかい
ノズルが長く
使いやすい



Pi プロダクト・イノベーション

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 2~3回使用しても排便がない場合

【その他の注意】

たちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがある。

【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
- 繊維質の多い食物と水分を多くとるよう心がけましょう。(例:野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻等)
- 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけましょう。
- 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

製造番号

使用期限

発売元

Pi株式会社プロダクト・イノベーション

富山県富山市浜黒崎239番地

製造販売元

池尻製薬株式会社

奈良県高市郡高取町大字下子島386番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室 ☎0744-52-2055
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

40

Piオリーール浣腸


日局 濃グリセリン
43%

40g

第2類医薬品

40g x 10個入

先端が柔らかい
ノズルが長く
使いやすい



Pi プロダクト・イノベーション