

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈外皮用薬〉

エプールHPクリーム

非ステロイド

非尿素

第2類医薬品

ヘパリン類似物質の3つの効果

1. 血行促進作用

血流の循環を良くして、皮ふの新陳代謝を促進します。

2. 抗炎症作用

荒れた皮ふの症状を鎮めて、皮ふ自身の持つ正常化機能を回復させます。

3. 保湿作用

乾燥皮ふの角質層内の水分量を増加させます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人

2. 次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 濡潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

きず・やけどのあと、皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼ってください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります。)
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進作用、抗炎症作用、水分保持作用があります。

添加物としてセタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、エドote酸ナトリウム水和物、ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 高温・直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社

電話 0598-30-5376 受付時間 10:00～17:00(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142