

食べる前にも・食べた後にも

ストマッシュエース 胃腸薬

(ウルソデオキシコール酸・ニンジン配合)

第3類医薬品

本剤の特徴

- 食べる前にも後にも、胃の働きをよくしてくれる胃腸薬です。
 - ・ 食べる前に服用すると、弱っている胃の機能を改善しながら、胃の働きをよくしてくれます。
 - ・ 食べた後やのんだ後に、胃もたれやおなかの張りが続く、胸がやける、胸がつかえるときなどに、この薬を服用すると胃内容物の排出を促進し、脂肪の消化を助けながら胃の調子を整えてくれます。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 次の診断を受けた人
腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

- もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感、消化不良による胃部・腹部膨満感
- はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 飲み過ぎ(過飲)、食べ過ぎ(過食)、胸やけ、胸つかえ
- 胃弱、食欲不振(食欲減退)、消化不良、消化促進

用法及び用量

次の1回量を食前又は食後に、水又は白湯で服用してください。

年齢	1回服用量		1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	○○○	3回
11歳以上15歳未満	2錠	○○	
8歳以上11歳未満	1・1/2錠	○○	
5歳以上8歳未満	1錠	○	
5歳未満	服用しないでください。		

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 5歳未満のお子様には服用させないでください。
- (3) 1錠を分割した残りを服用する場合には、清潔な紙につつま外箱中に保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分及び分量

成分	分量(9錠中)	作用
ウルソ デオキシコール酸	60mg	熊胆(ユウタン)の薬効成分で、利胆作用(肝臓の働きを活発にし、胆汁の分泌を促進)と共に消化管機能を改善する作用があります。
ニンジン末	120mg	食欲不振、消化不良に効く健胃生薬です。
ケイヒ末	300mg	
ショウキョウ末	90mg	
ゲンチアナ末	60mg	

添加物として、グリチルリチン酸2K、オウバク末、L-メントール、合成ヒドロタルサイト、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルクを含有します。

※生薬配合のため、製造ロットにより錠剤の色が異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口:076-438-1107
〔受付時間:月~金(祝祭日・年末年始を除く)9:00~17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元
株式会社プロダクト・イノベーション
富山県富山市浜黒崎239番地

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168