

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2015年12月 作成

A1

第②類医薬品

# 虫さされ・かゆみに ハラマインL

鎮痒消炎薬

## ハラマインLの特徴

- ・液体タイプで、スーッとこちよい清涼感を与えます。
- ・首の部分が曲がっていて、スポンジがピッタリと接しますので、背中や腰などの塗りにくい患部にもスムーズにむらなく適量を塗布できます。
- ・かゆみや炎症を抑える成分として、デキサメタゾン酢酸エステル、ジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しています。
- ・かゆみを抑える成分として、*l*-メントール、*dl*-カンフルを配合しています。
- ・殺菌作用のある成分として、イソプロピルメチルフェノールを配合しています。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
  - (2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が広範囲の人
  - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面も必ずお読みください。

## 効能・効果

かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、湿疹、皮膚炎、しもやけ




## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 使用する際は、スポンジ面をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから塗布してください。(スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。)
 

また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。
- (5) 患部を搔かないでください。本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
- (6) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (7) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。



## 成分・分量

成分	含量 (100g中)	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	炎症を抑え、はれ・赤み等の症状を改善します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部に対する殺菌作用があります。
l-メントール	3.0g	鎮痛作用を有し、清涼感のある刺激作用により痛みやかゆみをやわらげます。
dl-カンフル	2.0g	

添加物として、グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、アジピン酸ジイソプロピル、クエン酸、クエン酸Na、イソプロパノール、エタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用後は、速やかにキャップを十分に閉めて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。(保管方法を守らないと、塗布部のスポンジ破損の原因になったり、液漏れにつながる恐れがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



### 製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口:076-438-1107  
〔受付時間:月～金(祝日・年末年始を除く)9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168