

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 次の症状のある人  
口内のひどいただれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



### 【販売名】

マイゼロンガール

### 第3類医薬品

### 【効能・効果】

- 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄
- 口臭の除去

### 【用法・用量】

1回、本剤2～4mL(1～2目盛り)を水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) うがい用のみ使用してください。

### 【成分・分量】1mL中

成 分	ポビドンヨード
分 量	70mg(有効ヨウ素 7mg 含有)

添加物：グリセリン、ヨウ化カリウム、トメントール、エタノール、香料

#### <成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 衣服等に付着すると着色しますのでご注意ください。  
なお、付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。

発 売 元 株式会社プロダクト・イノベーション  
富山県富山市黒崎239番地

製造販売元 **リョバンメディック株式会社**  
富山県富山市横越168

お客様相談窓口：076-438-1107  
受付時間：月～金(祝祭日・年末年始を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度の間合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)