

●用法・用量

日2～4回、適量を患部に塗布して下さい。

●用法・用量に関する注意

(1) 定められた用法を守って下さい。(2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けて下さい。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 薬液が乾く後、患部をラップフィルム等の透気性の悪いもので覆わないで下さい。

●保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光を避け、キップをしっかりと閉めて涼しい所に立てて保管して下さい。(2) 子供の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入りかえらないで下さい。(4) 内容物の性状が変わり、色調が変わることがあります。(5) 本剤を火気に近づけないで下さい。また、使用後は火気に近づけないで下さい。(6) 凍結がある場合は、使用後はキャップをしっかしの閉めて下さい。(7) メガネ、時計、アクセサリー等の金銀、化粧品、プラスチック製品や厚紙等の包装材などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないようご注意ください。(8) 使用期限の過ぎた本品は使用しないで下さい。また、開封後は必ず期限内であってもなるべく早く使用して下さい。

火気厳禁

使用  
期限  
製造  
番号



第2類  
医薬品

ご使用に際して、この外箱の取扱い説明書を必ずお読みください。また、必要な時に備へるよう大切に保管してください。

販売名：サリトロンFBローション

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
1. 次の人は使用しないで下さい。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。  
2. 次の部位には使用しないで下さい。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 腫瘍、かぶれ、傷口又は化膿している患部。

● 相薬すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。  
(1) 患部の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

| 副作用名 | 症状                     |
|------|------------------------|
| 皮膚炎  | 発赤・発疹、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ |

3. 5～6日間で使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

●効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足指の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、挫傷

●成分・分量 (100ml中)

フェルビナク.....3.0g  
メンソール.....6.0g  
クロルフェニラミンマレイン酸塩.....0.1g  
※賦形物として、プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトリエタノールアミン、エタノールを含有する