

### 【使用上の注意】

【してはいけないこと】（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

**次の人は使用しないでください。**  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

#### 相談すること

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

●次の症状のある人：口内のひどいだれ  
●次の診断を受けた人：甲状腺機能障害

**2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (717イザン)	使用后すぐに、皮膚のがゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

**3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

製造販売元  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12  
昭和製薬株式会社  
お客様相談窓口 0120-920-598  
受付時間 9～17時（土・日・祝日を除く）

# のどの殺菌消毒に



うがい薬 PI  
ポビドンヨード  
300mL

第3類医薬品

### 【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

### 【用法・用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回ががいでください（付属のコップの2と4の線まで本品を入れ、水を60の線まで加え、うすめてからうがいしてください）。

#### ＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。うがい薬をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
- うがい用のみ使用し、キズややけどへの使用や内服しないでください。
- 本剤は使用するときとうすめて、早めに使用してください。

### 【成分・分量】

本品1mL中、ポビドンヨード 70mg

（有効ヨウ素 7mg含有）

添加物として、エタノール、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム水和物、ユーカリ油を含む。

#### ＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- 衣類に付着したときはすぐに洗い流してください。
- 使用後はすぐに洗面台等を水で洗い流してください（そのまま放置すると、洗面台等が変色することがあります）。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



ポトルキャップ  
フィルムラベル  
コップ

販売名：ポビガール「昭和」 第3類医薬品  
副作用被害救済制度 電話 0120-149-931




U1701

### 使用方法



1 本品を2と4の線の間まで入れる



2 水を60の線まで加え、うすめてからうがいする