

のどの荒れと痛みに フルミンのどスプレー

最近、風邪だけでなくタバコの吸い過ぎや空気の汚染が原因で、のどの痛みやのどあれの人が多くみられます。タバコは勿論、排気ガスや花粉、ホコリなどを含む汚染空気の中には、目に見えないのどをいためる物質が多く含まれていますので毎日吸入していると、知らず知らずのうちにのどの粘膜は汚れて、のどの炎症は拡がり、のどあれの原因になります。フルミンのどスプレーはのどのあれや痛みなどのある患部に直接効きめの成分を噴射する、新しいタイプの「のど用治療薬」です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 授乳中の人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) ヨウ素によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。口内のひどいただれ
- (7) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
ショック	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
アナフィラキシー	

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

■効能・効果／のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ。

■成分・分量／(1mL中)ポビドンヨード……………4.5mg

添加物：ℓ-メントール、グリセリン、ヨウ化K、サッカリンNa、エタノール


■用法・用量／1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いる。

【用法・用量に関連する注意】

(1) のどの患部にノズルをむけて、軽く息をはきながら、ピュッピュッと2～3回直射してください。

〈息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。〉

- (2) 本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。




〈使用方法〉

口を大きくあけて、のどの患部に直射すれば、痛みやあれた患部を正常な状態に治してくれます。

1回2～3噴射を目安に、1日3～5回使用してください。

なお、のどに噴射した薬液は、そのままのみ込んでも影響ありません。



※最初は液が出るまで4～5回押してください。

※キャップがしっかりとハマっていないと液もれすることがありますのでご注意ください。

■保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 衣服等に付着すると着色するので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) ノズルの先端を針等で突くと折れた時に大変危険ですので、絶対にやめてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **池尻製薬株式会社**

〒635-0151

奈良県高市郡高取町大字下子島386番地

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は右記にお願いいたします。

お客様相談室 ☎ 0744-52-2055

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)